



ТАБАК РАЗРУШАЕТ ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ

ЖЕНЩИНЫ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

Если вы курите, в **3–4** раза снижается вероятность наступления беременности в течение года

на **65%** возрастает риск отслойки плаценты у беременных курильщиц

на **20%** повышается риск заболеваний детей бронхочной астмой, бронхитом и другими респираторными заболеваниями в семьях, где родители курят



ЭТО ВАЖНО!

Курение родителей наносит вред здоровью ребёнка!

Если Вы когда-либо планируете стать матерью – не начинайте курить



Вспомогательная функция, у которой полное обновление сперматозоидов происходит за 2–3 месяца. Взаимосвязанная с образованием, их выработкой и формированием происходит и заканчивается ещё до выхода из яичника.

Если вы курите, то ваша яйцеклетка, как и остальные органы, страдает никотином. Это приводит к тому, что снижается способность к оплодотворению, снижается выживаемость и развитие ребёнка. Уровни гемоглобина у курящих женщин составляют порядка 70% от нормальных значений.

Курение до беременности – это ещё и негативная зависимость, от которой не избавиться совсем без вреда. Без вреда не получится и в период, а также сразу после – вернуть здоровье.

Курение и беременность не совместимы

1 Если в первом триместре начнется выкидыш, то курящая женщина уже потеряет ребёнка. Если же вы всё же родите с помощью курения, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

2 Если курящая женщина забеременела, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

3 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

4 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

5 Если курящая женщина забеременела, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

6 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

7 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

8 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

9 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

10 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

Курение после рождения ребёнка

1 Если курящая женщина курит во время беременности, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

2 Если курящая женщина курит во время беременности, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

3 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

4 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

5 Если курящая женщина курит во время беременности, то риск выкидыша в первом триместре составляет 20%. Во втором триместре выкидыш случается в 10%, а в третьем – в 5% случаев.

6 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

7 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

8 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

9 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

10 Курение во время беременности повышает риск рождения ребёнка с различными заболеваниями. Дети курящих родителей имеют различные дефекты развития.

БЕРЕМЕННОСТЬ – ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ ДЛЯ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. ПАРЫ С БОЛЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ДОСТИГАЮТ УСПЕХА, ЕСЛИ БРОСАЮТ КУРИТЬ ВМЕСТЕ

КУРЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ БЕСПЛОДИЯ И У МУЖЧИН ВО-ПЕРВЫХ, У КУРЯЩИХ МУЖЧИН СНИЖАЕТСЯ ВЫРАБОТКА СПЕРМАТОИДОВ, ИХ МОРФОЛОГИЯ И ПОДВИЖНОСТЬ, А ТАКЖЕ СЕКРЕЦИЯ МУЖСКИХ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ. ВО-ВТОРЫХ, КУРЕНИЕ ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ИМПОТЕНЦИИ

УЗНАЙ БОЛЬШЕ КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ www.takzdorovo.ru 8 800 200 0 200

Дать ответ здоровью! Можешь только ты!



www.takzdorovo.ru